

# Lizipaina<sup>®</sup> comprimidos para chupar

Lisozima hidrocloreto / Papaína / Bacitracina

## Composición:

Un comprimido contiene:

Lisozima hidrocloreto (obtenida del huevo) 5 mg

Papaína 2 mg

Bacitracina 3 mg

Excipientes: Sacarina, sorbitol, aroma de menta, estearato de magnesio, c.s.

## Forma farmacéutica y contenido del envase

Envase con 1 tubo de 20 comprimidos para chupar.

## Actividad

Antiinfeccioso bucofaríngeo.

## Titular y fabricante

Titular:

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Prat de la Riba, 50

08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Fabricante:

Delpharm Reims, S.A.S.

10, Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims (Francia)

## Indicaciones

Alivio sintomático de las afecciones leves de la garganta y de la boca:

- irritaciones de la garganta,
- pequeñas heridas leves de las encías como las producidas por dentaduras postizas,
- ronqueras y afonías.

## Contraindicaciones

Niños menores de 3 años (presencia de aroma de menta).

Sensibilidad o alergia a alguno de sus componentes.

Si es alérgico al huevo no tome este medicamento debido a que la lisozima se obtiene de este alimento.

## Precauciones

No administrar a niños menores de 6 años, sin consultar al médico.

Si los síntomas persisten más de 2 días, o se agravan, o van acompañados de fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, consultar al médico lo antes posible.

## Interacciones

Evitar la utilización simultánea con otros antisépticos bucofaríngeos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento.

## Advertencias

**Advertencia sobre excipientes:**

Este medicamento contiene 1,4 g de sorbitol como excipiente por comprimido. Puede causar molestias de estómago y diarrea. No debe utilizarse en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa.

#### **Embarazo y lactancia:**

##### **Importante para la mujer:**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

##### **Uso en niños:**

Ver precauciones y contraindicaciones.

##### **Uso en ancianos:**

No se dispone de información específica.  
Consultar al médico.

##### **Efectos sobre la capacidad de conducción:**

No se han descrito

##### **Posología**

###### *Adultos:*

1 comprimido disuelto en la boca, cada dos horas, hasta un máximo de 6 a 8 comprimidos al día.

###### *Niños de 6 a 15 años:*

Dosis máxima de 3 a 4 comprimidos al día.

##### **Instrucciones para la correcta administración del preparado:**

No masticarlos ni tragarlos enteros.

Dejar deshacer lentamente el comprimido en la boca.

##### **Sobredosis**

En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes dosis pueden producirse molestias digestivas.

Acudir a un Centro Médico indicando el producto y la cantidad ingerida, o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

##### **Reacciones adversas**

Raras veces, reacciones alérgicas.


Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte a su médico o farmacéutico.

##### **Conservación**

No conservar a temperatura superior a 25 °C

##### **Caducidad**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesite en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños**

**Texto revisado:** Diciembre 1999



La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.