

Sedatif PC

COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para Vd.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado SEDATIF PC comprimidos para obtener los mejores resultados.

- *Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.*
- *Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.*
- *Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico.*

En este prospecto:

- 1- ¿Qué es SEDATIF PC comprimidos y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar SEDATIF PC comprimidos
- 3- ¿Cómo tomar SEDATIF PC comprimidos?
- 4- Posibles efectos adversos
- 5- Conservación de SEDATIF PC comprimidos

SEDATIF PC comprimidos.

SEDATIF PC también está disponible en tubos de gránulos.

Las sustancias activas son:

Aconitum napellus	6 CH
Belladonna	6 CH
Calendula officinalis	6 CH
Chelidonium majus	6 CH
Abrus precatorius	6 CH
Viburnum opulus	6 CH
aa 0,5 mg.	

Los demás componentes son: sacarosa (225 mg), lactosa (72 mg) y estearato de magnesio, c.s.p 1 comprimido de 300 mg.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON SIH, s.a. - Av. Valdelaparra, nº 27
28108 Alcobendas - MADRID

Fabricante:

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais -
69510 Messimy - FRANCIA

1. ¿QUÉ ES SEDATIF PC comprimidos Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

SEDATIF PC comprimidos se presenta en caja de 40 y 90 comprimidos.

SEDATIF PC es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para aliviar los trastornos emocionales y de ansiedad que pueden venir acompañados de posibles trastornos del sueño.

2. ANTES DE TOMAR SEDATIF PC comprimidos

No debe administrar este medicamento a pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a cualquier otro componente del preparado.

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte con su médico o farma-

cético antes de tomar un medicamento. A la dosis recomendada SEDATIF PC comprimidos no ejerce ningún efecto sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinaria.

Este medicamento contiene sacarosa y lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomarlo. Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene 450mg de sacarosa cada dos comprimidos y 144 mg de lactosa cada dos comprimidos.

"Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica."

3. ¿CÓMO TOMAR SEDATIF PC comprimidos?

Disolver en la boca 2 comprimidos 3 veces al día.

Vía oral.

"Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas".

"Recuerde tomar su medicamento"

Si estima que la acción de SEDATIF PC comprimidos es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, consulte a su médico.

Si usted ha tomado SEDATIF PC comprimidos más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o a su farmacéutico.

Si olvidó tomar SEDATIF PC comprimidos, no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, SEDATIF PC comprimidos puede tener efectos adversos.

Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Comunicación de efectos adversos


Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: www.notificaram.es.

Mediante los envases y los medicamentos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE SEDATIF PC comprimidos

No se precisan condiciones especiales de conservación.

No utilizar este medicamento después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura.

Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el punto  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.