

068125/5002 GP ES



Angin-Heel

SD

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Hydrargyrum bicyanatum D8, Phytolacca D4, Apis mellifica D4, Arnica D4 ana 30 mg; Hepar sulfuris D6, Belladonna D4 ana 60 mg. 1 comprimido contiene aprox. 300 mg de lactosa. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Títular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n, 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones Terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en amigdalitis.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al árnica.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Advertencia especial: En caso de amigdalitis de reaparición frecuente y fiebre durante más de tres días o de más de 39 °C, deberá consultar a un médico, así como en caso de presentar síntomas difusos o prolongados. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.



-Heel




Auflage: 5002
Code: 1230
Format: 105 x 148 mm

Druckfarben:
Schwarz = Pantone 432

Nochmals Korrekturabzug

Druckreif ohne Korrektur

Datum/Unterschrift



Posología: Vía oral. En afecciones agudas, 1 comprimido cada 30-60 minutos dejándolo disolver en la boca (máximo 12 veces al día). En formas de evolución crónica, 1 comprimido 3 veces al día dejándolo disolver en la boca.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: Puede aparecer hipersalivación tras la toma, en cuyo caso debe interrumpirse la administración del medicamento. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en casos aislados en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (Arnica). Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE ☒ de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Nochmals Korrekturabzug _____
Druckreif ohne Korrektur _____

Datum/Unterschrift