

Euphorbium^{comp.SN}

Solución para nebulización

Medicamento homeopático

Vía de administración: nasal

Composición: 100 g contienen: Euphorbium D4 1 g; Pulsatilla pratensis D2 1 g; Luffa operculata D2 1 g; Hydrargyrum biiodatum D8 1 g; Hepar sulfuris D10 1 g; Argentum nitricum D10 1 g. Excipientes: Dihidrógeno fosfato de sodio dihidrato, Hidrógeno fosfato de sodio dihidrato, Cloruro de sodio, Agua para preparaciones inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Frasco nebulizador nasal conteniendo 20 ml de solución.

Titular:
Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/ Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en rinitis de origen diverso (viral, bacteriano, alérgico), rinitis seca, rinitis hipertrófica y atrófica, como tratamiento coadyuvante en caso de ecema. Sinusitis crónica. Para facilitar la respiración nasal en caso de rinitis alérgica.

Contraindicaciones: No se han descrito.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento.

Posología: Vía nasal. En general, 1-2 nebulizaciones en cada orificio nasal de 3 a 5 veces al día; para niños de 2-5 años, 1 nebulización de 3 a 4 veces al día.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos muy raros, durante su administración puede aparecer una irritación de la mucosa nasal con quemazón y secreción aumentada. En estos casos se deberá suspender la administración del medicamento. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. Proteger del calor.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase o, en su caso, 6 meses tras su apertura.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE ☒ de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.

071516/5002 GP ES

Auflage: 5002

Code: 1260


Format: 200 x 270 mm

Druckfarben:


Pantone 432

Normas para la correcta administración del preparado:


1. Quitar el tapón protector.



2. Antes de usar por primera vez, ejercer una acción de bombeo varias veces hasta que aparezca la nebulización.



3. Introducir la apertura del nebulizador en la fosa nasal y bombear. Después de usar volver a tapar.



-Heel

Nochmals Korrekturabzug	—
Druckreif ohne Korrektur	—

Datum/Unterschrift	