

068153/5001 GP ES



Zeel^T

Comprimidos

Medicamento homeopático

Composición: 1 comprimido contiene: Cartilago suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Embryo suis D4, Placenta suis D4 ana 0,30 mg; Rhus toxicodendron D2 0,54 mg; Arnica montana D1 0,60 mg; Solanum dulcamara D2, Symphytum D8 ana 0,15 mg; Sanguinaria canadensis D3 0,45 mg; Sulfur D6 0,54 mg; Nadidum D6, Coenzima A D6, Acidum alpha-liponicum D6, Natrium diethyl-oxalaceticum D6 ana 0,03 mg; Acidum silicicum D6 3,00 mg. Excipientes: lactosa, estearato de magnesio. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Envase conteniendo 50 comprimidos de 301,5 mg.

Titular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n.
28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en artrosis (particularmente gonartrosis), poliartrosis, espondilartrosis y periartrosis escapulo humeral.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las plantas de la familia de las anacardiáceas y de las compuestas. Zeel T sólo debería utilizarse tras consultar al médico en casos de hepatopatía activa o antecedentes de la misma, así como si se utiliza en combinación con fármacos hepatotóxicos. Por incluir en su composición *Sanguinaria canadensis* (*sanguinaria del Canadá*), Zeel T no se deberá administrar durante el embarazo y la lactancia.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Auflage: 5001

Code: 1289


Format: 105 x 148 mm

Druckfarben:

Schwarz = Pantone 432



-Heel



Nochmals Korrekturabzug —

Druckreif mit Korrektur —

Druckreif ohne Korrektur —

Datum/Unterschrift _____



Advertencias: Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria. Consulte a su médico en caso de molestias articulares en las que aparezcan, por ejemplo, enrojecimiento, hinchazón o sobrecalentamiento, así como en caso de presentar síntomas difusos o prolongados. En caso de administración durante más de 4 semanas deben controlarse los valores de la función hepática. Advertencia sobre excipientes: Este medicamento contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.


Posología: Vía oral. En general, 1 comprimido 3-5 veces al día, dejándolo disolver en la boca.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: Durante el tratamiento con medicamentos que contienen alcaloides de Sanguinaria se ha observado, en casos aislados un aumento de los valores de la función hepática (transaminasas) y de la bilirrubina sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamento (hepatitis tóxica medicamentosa) que se normalizó o remitió tras interrumpir la administración del medicamento. En casos aislados pueden aparecer molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la administración. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en casos aislados en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia de las compuestas (árnica). Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: Consérvese en lugar fresco y seco. No utilice este medicamento si observa que el precinto de seguridad está roto, dañado o no existe.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Nochmals Korrekturabzug _
Druckreif mit Korrektur _
Druckreif ohne Korrektur _

Datum/Unterschrift _____