




070149/5002 GP ES



Viburcol

Solución oral

Medicamento homeopático

Composición: 1 envase unidosis de 1 ml contiene: Belladonna D6 11 mg; Chamomilla D4, Dulcamara D6, Plantago D4 ana 25 mg; Pulsatilla D6 50 mg; Calcium carbonicum Hahnemanni D8 75 mg. Excipientes: Cloruro de sodio, agua para inyectables. Elaborado conforme a las normas de la Farmacopea Homeopática Alemana (HAB).

Forma farmacéutica y contenido del envase: Estuche conteniendo 15 envases unidosis de 1 ml de solución oral.

Títular:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/Madroño, s/n., 28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Fabricante:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Baden-Baden, Alemania

Indicaciones terapéuticas: Medicamento tradicionalmente utilizado en lactantes y niños en caso de intranquilidad con o sin fiebre (por ejemplo durante la dentición o por dolor abdominal leve). Tratamiento sintomático en caso de infecciones banales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a Chamomilla o a las plantas de la familia de las compuestas.

Precauciones: No se han descrito.

Interacciones: No se han descrito.

Advertencias: No se han descrito efectos tóxicos causados por las diluciones homeopáticas de las sustancias contenidas en este medicamento durante el embarazo y la lactancia. Si está Usted embarazada, o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Consulte a su médico si los síntomas persisten o se agravan durante la utilización de este medicamento. No afecta a la capacidad de conducción o al manejo de maquinaria.

Auflage: 5002

Code: 16

Format: 105 x 148 mm

Druckfarben:

Pantone 432






-Heel



Nochmals Korrekturabzug —

Druckreif ohne Korrektur —

Datum/Unterschrift _____




Posología: Vía oral. En general: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 envase unidosis 3 veces al día. Menores de 2 años: 6 gotas 3 veces al día. Niños entre 2-5 años: 9 gotas 3 veces al día. Niños entre 6-11 años: 12 gotas 3 veces al día. En casos agudos: Adultos y niños a partir de 12 años: 1 envase unidosis cada ½-1 hora, como máximo 12 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Menores de 2 años: 6 gotas cada ½-1 hora, como máximo 12 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 2-5 años: 9 gotas cada ½-1 hora, como máximo 12 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Niños entre 6-11 años: 12 gotas cada ½-1 hora, como máximo 12 veces al día, y después se continúa con la dosis estándar. Para abrir el envase unidosis, girar la parte superior y, para administrar el medicamento, presionar sobre la parte inferior.

Sobredosis: Dada la naturaleza de este preparado, la intoxicación es poco probable. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

Reacciones adversas: En casos raros pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas. Si observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farmacéutico.

Conservación: No almacenar por encima de 25 °C.

Caducidad: Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha indicada en el envase. Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños.



Nochmals Korrekturabzug

Druckreif ohne Korrektur

Datum/Unterschrift